

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

SPECIALITATEA**ASISTENTA MEDICALA GENERALA****TEST - GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTIȚELOR**

1. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru:

- a) Nu este obligatorie încheierea unei asigurări de răspundere civilă.
- b) Pentru bunuri.
- c) Greșeli în activitatea profesională.

2. În categoria deșeurilor anatomo-patologice sunt incluse următoarele:

- a) Fragmente și organe umane (lichide organice, material biopsie rezultat din blocurile operatorii de chirurgie și obstetrică, recipiente de sânge și sânge).
- b) Pansamentele impregnate cu sânge, seringi folosite, tubulatura transfuzoarelor, pungi de sânge.
- c) Deșeurile care conțin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice.

3. Identificați varianta falsă referitoare la atribuțiile asistentului medical în cadrul unei intervenții endoscopice:

- a) Participă la pregătirea pacientului și asigură poziția pacientului în timpul examenului.
- b) Îngrijește și supraveghează starea pacientului înainte și după examen.
- c) Obține consimțământul informat și explică pacientului derularea examinării.

4. Precizați care variantă este adevărată din următoarele enunțuri:

- a) Asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical nu sunt obligați să asigure îngrijirile de sănătate și tratamentele prescrise pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA.
- b) Păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau tratament astfel de persoane.
- c) Între specialiștii medico-sanitari, informațiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient nu trebuie să fie comunicate.

5. La sugarul mic necesarul de apă pe Kg/corp este:

- a) 100ml /kg corp /zi;
- b) 200 ml/kg corp /zi;
- c) 50 ml /kg corp /zi;

6. Profesia de asistent medical generalist, moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:

- a) În regim salarial și/sau independent.
- b) Numai în regim salarial.
- c) În regim independent.

7. În schema calendarului de vaccinări obligatorii vaccinul antihepatitic B se face:

- a) În primele 24 de ore după naștere.
- b) La 4 luni.
- c) La 3 -7 zile de la naștere.

8. Una din complicațiile tardive postransfuzionale care pot apărea la copilul căruia i se administrează o transfuzie este:

- a) Contaminarea cu virus hepatitic B sau C.
- b) Cefalee, dispnee.
- c) Icter hemolitic, hipotensiune arterială.

9. Una din formele de hepatită de mai jos se transmite parenteral:

- a) Hepatita B.
- b) Hepatita E.
- c) Hepatita A.

10. Unul dintre oligoelementele următoare are rol în hematopoieză:

- a) Florul.
- b) Cuprul.
- c) Iodul.

11. Alegeți varianta corectă de răspuns referitoare la testul Bowie & Dick :

- a) Este o fiolă de plastic care are în interior un strip impregnat cu *Geobacillus stearothermophilus*.
- b) Este un test de verificare a penetrării aburului la autoclav.
- c) Este un strip impregnat cu *Bacillus Atrophaeus* pentru sterilizarea cu aer cald.

12. Bifați varianta corectă referitoare la aspectele care vizează dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului conform legii drepturilor pacientului:

- a) Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
- b) Informațiile medicale care sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului sunt comunicate doar cu exprimarea consimțământului pacientului.
- c) Pacientul nu poate desemna o persoană care să poată avea acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.

13. Vă rugăm să identificați care dintre testele menționate mai jos nu sunt prevăzute în protocolul de efectuare a testelor pretransfuzionale al spitalului stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1224/ 2006:

- a) Testul Quick și viteza de sedimentare.

- b) Determinarea grupului sanguin ABO și Rh(D) la pacient.
- c) Depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienților imunizați și politransfuzăți.

14. Pentru Mycobacterium tuberculosis se utilizează:

- a) Colorația Ziehl - Nielsen.
- b) Colorația Gram.
- c) Colorația Giemsa.

15. Scala Lawton reprezintă un instrument de:

- a) Evaluare funcțională a vârstnicului.
- b) Evaluare a riscului de dezvoltare a escarelor la vârstnici.
- c) Evaluare a riscului de cădere la vârstnici.

16. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

- a) Documente de studii care atestă formarea în profesie.
- b) Orice documente.
- c) Certificatul de membru.

17. Secretul profesional:

- a) Nu există și față de aparținători, colegi sau alte persoane din sistemul sanitar neinteresate de tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul pacientului.
- b) Are ca obiect tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.
- c) Nu este obligatoriu.

18. Insuficiența respiratorie acută poate să apară în condițiile unui aer viciat prin:

- a) Căderea CO₂.
- b) Scăderea O₂.
- c) Scăderea ventilației.

19. Tratamentul entorsei presupune:

- a) Repaus articular 1-2 zile, prin imobilizare într-o fașă sau bandaj elastic.
- b) Repaus articular și imobilizare în aparat gipsat 4 săptămâni.
- c) Repaus articular și imobilizare în aparat gipsat 2 săptămâni.

20. Precizați care dintre afirmațiile de mai jos nu fac parte din obiectivele supravegherii expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice:

- a) Evaluarea cunoștințelor personalului medical cu privire la precauțiunile standard și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.
- b) Sensibilizarea personalului medical în sensul cunoașterii riscului expunerii la sânge și la alte produse biologice și a aplicării măsurilor de prevenire a acestor expuneri accidentale și a consecințelor acestora.

c) Estimarea incidenței expunerii accidentale la produse biologice a personalului, estimarea incidenței expunerii accidentale la produse biologice a personalului și aplicarea corectă a măsurilor profilactice primare și secundare

21. Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt:

- a) Competența, corectitudinea și comunicarea.
- b) Profesionalismul, cooperarea și empatia.
- c) Experiența profesională, responsabilitatea și cinstea.

22. Rolul glucidelor în organism este

- a) Determină presiunea coloid -osmotică.
- b) Protector, în jurul unor organe.
- c) Plastic (structural).

23. Hidrartroza reprezintă:

- a) Prezența sângelui în articulație.
- b) Prezența de lichid clar, de reacție, în articulație.
- c) Prezența unui transudat în regiunile periarticular.

24. Pentru hemostază locală garoul se așează corect:

- a) Proximal față de plagă în hemoragiile arteriale.
- b) Proximal față de plagă în hemoragiile venoase.
- c) Distal față de plagă în cazul hemoragiilor arteriale.

25. Vitamina B1 mai este cunoscută sub denumirea de:

- a) Riboflavină.
- b) Piridoxină.
- c) Tiamină.

26. Complicația majoră în cazul dializei peritoneale este:

- a) Hidronefroza.
- b) Peritonita.
- c) Pielonefrita.

27. În infecția cu HIV există o „fereastră serologică” seronegativă deși persoana este contagioasă, care durează:

- a) 6 - 12 săptămâni.
- b) 1- 2 săptămâni.
- c) 4 - 5 săptămâni.

28. Alimentația pe gastrostomă este o tehnică efectuată :

- a) Doar de personalul medical special instruit.
- b) Poate fi realizată și de pacient după ce acesta a fost instruit în acest scop.
- c) Doar de medic.

29. Una din cauzele prerenale de IRA (insuficiență renală acută) este:

- a) obstrucția uretrală;
- b) hipovolemia;

c) glomerulonefrita;

30. În cadrul procedurii de pregătire cutanată în faza preoperatorie, metodele acceptate pentru îndepărtarea pilozității din zona supusă intervenției chirurgicale sunt:

- a) Raderea mecanică a pilozităților.
- b) Raderea și tunderea pilozităților.
- c) Depilarea cu ajutorul cremei speciale și tunderea pilozităților.

31. În BPOC (bronhopneumonia cronică obstructivă) măsurile preventive cuprind în primul rând:

- a) Expunerea la noxe respiratorii.
- b) Întreruperea definitivă a fumatului.
- c) Frecventarea zonelor aglomerate.

32. În cadrul protocolului postexpunere la produse biologice, atribuțiile compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical din spitalul în care s-a produs expunerea accidentală la produse biologice sunt:

- a) Urmărește apariția semnelor evocatorii de infecție HIV/VHB/VHC.
- b) Înregistrează evenimentul în registrul propriu al expunerilor accidentale la produse biologice.
- c) Răspunde de informarea personalului cu privire la obligativitatea raportării expunerii accidentale și metodele de prevenire.

33. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de:

- a) Organizațiile sindicale.
- b) Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
- c) Ministerul Educației.

34. Identificați care dintre activitățile menționate mai jos nu pot fi exercitate de asistentul medical generalist în conformitate cu prevederile OUG nr. 144/2008:

- a) Administrarea tratamentului, conform prescripțiilor medicului.
- b) Îngrijirea și asistarea mamei în timpul travaliului și monitorizarea stării fetei în utero prin mijloace clinice și tehnice adecvate.
- c) Desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate în cazul în care asistenții medicali generaliști sunt licențiați.

35. Registrele de evidență a sterilizării, alături de indicatorii fizico-chimici corespunzători fiecărei șarje de sterilizare, au recomandarea de a fi păstrate pe fiecare secție unde se efectuează procedura de sterilizare minimum:

- a) 3 ani.
- b) 6 luni.
- c) 12 luni

36. "Vitamina antipernicioasă" este numită:

- a) Vitamina B12.
- b) Vitamina B6.
- c) Vitamina B2.

37. Identificați afirmația eronată referitoare la dreptul pacientului la informația medicală :

- a) Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
- b) Pacientul nu are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
- c) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

38. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

- a) Sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei.
- b) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.
- c) Proceduri de practică pentru asistenți medicali.

39. În ce situație este recomandată aplicarea procedurii de dezinfecție igienice a mâinilor prin spălare cu apă și săpun antiseptic:

- a) Înainte și după utilizarea toaletei.
- b) După contactul cu un pacient infectat și/sau cu obiectele din salonul acestuia.
- c) Înainte de o intervenție chirurgicală.

40. Cauza principală (90- 95 %) în infarctul miocardic este:

- a) Ateroscleroza.
- b) Coronarita.
- c) Embolia.

41. Vă rugăm să alegeți varianta corectă referitoare la modul de realizare a manevrelor de resuscitare la victima inconștientă și fără respirație prezentă:

- a) Se vor realiza 30 compresii toracice / 1 ventilație.
- b) Se vor realiza 30 compresii toracice / 2 ventilații.
- c) Se vor realiza 15 compresii toracice /2 ventilații.

42. Frecvența efectuării testelor de autocontrol în unitățile sanitare este stabilită de:

- a) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății.
- b) Planul anual de prevenire, supraveghere și limitare a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, elaborat de către serviciul/compartimentul și aprobat de comitetul director al unității sanitare.
- c) Planul anual de control întocmit de Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

43. Vă rugăm să alegeți varianta corectă privind conduita asistentului medical în cazul ultimului control pretransfuzional efectuat la patul pacientului:

- a) Ultimul control pretransfuzional cuprinde verificarea identității pacientului, verificarea aspectului macroscopic și a integrității unității de transfuzat, verificarea compatibilității dintre unitatea de sânge selectată și pacient prin determinarea grupului sanguin ABO și Rh(D) la pacient, determinarea grupului sanguin ABO și Rh (D) la unitatea de transfuzat, verificarea documentației, înregistrarea în foaia de observație.

- b) Ultimul control pretransfuzional cuprinde monitorizarea funcțiilor vitale ale pacientului, recoltarea analizelor de sânge recomandate de medicul curant și monitorizarea reacțiilor adverse ale pacientului la administrarea produselor de sânge.
- c) Ultimul control pretransfuzional cuprinde verificarea existenței consimțământului pacientului, efectuarea hemoleucogramei, verificarea funcționalității liniei venoase, monitorizarea funcțiilor vitale a pacientului și monitorizarea reacțiilor adverse la administrarea produselor de sânge.

44. Activitatea de donare sânge se realizează în cadrul:

- a) Cabinetelor din ambulator special amenajate.
- b) Secțiilor de anestezie și terapie intensivă.
- c) Centrelor de transfuzie sau unităților mobile.

45. Identificați afirmația falsă referitoare la scopul principal al Codului de etică și deontologie:

- a) Contribuie la recunoașterea profesiei, a responsabilității și încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere.
- b) Apără demnitatea și prestigiul profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.
- c) Promovează drepturile și obligațiile profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașe și asistenții medicali.

46. Dieta pacientului cu infarct miocardic este:

- a) Hipoglucidică.
- b) Hipercalorică.
- c) Hidro -zaharată în primele 2-3 zile.

47. În compoziția celulelor vii intră ca substanță de bază:

- a) Proteinele.
- b) Lipidele.
- c) Glucidele.

48. Identificați varianta corectă care se referă la asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea tehnicii de aspirație gastrică:

- a) Tavă sau cărucior pentru materiale, sonde radioopace de cauciuc sau din material plastic sterile, seringă de 20 ml, seringă Guyon (50 ml) sterilă, tăviță renală, soluție pentru lubrifiere (aqua gel), mănuși de unică folosință, comprese, pungă colectoare pentru colectarea conținutului, pahar mat, leucoplast, prosoape, șervețele de hârtie, câmp pentru protecția lenjeriei.
- b) Sonda Nelaton, seringă de 20 ml, seringă Guyon (50 ml) sterilă, tăviță renală, soluție pentru lubrifiere (aqua gel), mănuși de unică folosință sterile, pungă colectoare pentru colectarea conținutului, pahar mat, leucoplast, prosoape, șervețele de hârtie, câmp pentru protecția lenjeriei.
- c) Cărucior pentru materiale, sondă Foley, seringă de 20 ml, seringă Guyon (50 ml) sterilă, tăviță renală, soluție pentru lubrifiere (aqua gel), mănuși de unică folosință sterile, comprese, pungă colectoare pentru colectarea conținutului, pahar mat, leucoplast, prosoape, șervețele de hârtie, câmp steril pentru protecția lenjeriei.

49. În evaluarea stării pansamentului vor fi evaluate cu prioritate următoarele aspecte:

- a) Diureza și ingestia lichidiană zilnică.

b) Funcțiile vitale: puls, tensiune arterială, respirație, saturație de oxigen, temperatură.

c) Existența secreției, cantitatea, aspectul, culoarea, mirosul acesteia.

50. Eliberarea copiilor documentelor medicale de către unitățile sanitare trebuie să fie realizată în termen de maximum:

a) 48 de ore de la înregistrarea solicitării.

b) 7 zile de la înregistrarea solicitării.

c) 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

51. Bolnavii cu tuse convulsivă sub tratament antibiotic sunt izolați la domiciliu:

a) 5 zile;

b) 21 zile .

c) 10 zile ;

52. Identificați care dintre patologiile menționate mai jos nu au indicație pentru spălătură gastrică:

a) Stenoză pilorică pentru îndepărtarea stazei.

b) Intoxicații alimentare și supradozarea medicamentelor.

c) Rectocolita ulcerohemoragică.

53. Incubația în gripă este:

a) Lungă 20 zile.

b) Fixă 5 zile.

c) Scurtă 11 -36 ore.

54. Arsurile de gradul II:

a) Implică numai epidermul.

b) Distrug în totalitate epidermul și dermul.

c) Implică epidermul și o parte din structurile dermului.

55. Supravegherea clinică și paraclinică a pacientului în perioada postoperatorie vizează:

a) Doar mobilizarea imediată și reluarea alimentației.

b) Doar diminuarea durerii.

c) Starea de cunoștință, funcțiile vitale (P, T.A., T° și frecvența respiratorie), starea plăgii: aspectul pierderilor exteriorizate prin drenuri sau prin pansament, reluarea tranzitului și constantele biologice la indicația medicului.

56. Avizul anual se acordă:

a) Numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni.

b) Numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

c) Nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.

57. Identificați care dintre activitățile mai jos menționate nu se desfășoară în unitatea de transfuzie sanguină:

- a) Recoltarea unităților de sânge total și a componentelor sanguine.
- b) Efectuarea testelor pretransfuzionale.
- c) Prezervarea probelor biologice pretransfuzionale și a unităților de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional.

58. Pentru respectarea dozelor, echivalența pentru medicamentele sub formă de pulbere pentru “o linguriță rasă” este:

- a) 2,5 - 5 gr.
- b) 1,5 - 2,5 gr.
- c) 1 - 1,5 gr.

59. Identificați în care situație un asistent medical generalist, moașă sau asistent medical nu își poate exercita profesia pe teritoriul României:

- a) Se află într-o stare de incompatibilitate.
- b) Sunt posesori ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moașă și asistent medical și sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.
- c) Sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

60. Scala și indexul Barthel evaluează:

- a) Capacitatea vârstnicului de a realiza activitățile de îngrijire personală mai complexe, referindu-se la activitățile necesare pentru a-și susține traiul autonom cum ar fi: capacitatea de a folosi telefonul, de a găti, de a face cumpărături, de a spăla rufe, de a gestiona resursele financiare, de a-și administra medicația și de a-și pregăti masa.
- b) 10 funcții în autoîngrijire: hrănirea, mutarea din căruciorul cu roțile în pat și invers, efectuarea igienei personale, deplasarea până și de la toaletă, îmbăierea, deplasarea pe suprafețe drepte, fără denivelări, împingerea căruciorului cu roțile, urcarea și coborârea scârilor, îmbrăcare/dezbrăcare, menținerea continenței intestinale, controlarea vezicii urinare.
- c) Activitățile traiului de zi cu zi al vârstnicului fiind o metodă foarte des folosită pentru evaluarea abilităților de a realiza 6 activități zilnice de îngrijire personală: îmbăiere, îmbrăcare, asigurarea igienei, transferul, controlul sfincterelor, hrănirea.

61. Supravegherea funcțiilor vitale, starea pansamentului și volumul drenajelor în perioada imediată postoperatorie până la revenirea stării de cunoștință a pacientului se va realiza din:

- a) 15 în 15 minute.
- b) 30 în 30 minute.
- c) 60 în 60 minute.

62. În entorse, suprafețele articulare:

- a) Se deplasează permanent, pierzându-și raporturile între ele.
- b) Execută între ele mișcări normale.
- c) Nu se îndepărtează complet una față de cealaltă.

63. Protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice cuprinde următoarele etape principale:

- a) Spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului.

- b) Recoltarea eşantioanelor de sânge de la personalul expus accidental în maximum 2 ore de la momentul expunerii.
- c) Îngrijire de urgență în funcție de tipul de expunere, chimioprofilaxie, pentru infecția HIV, administrată în funcție de tipul expunerii, starea pacientului-sursă și vaccinare postexpunere în funcție de recomandarea medicului specialist.

64. Factorii de mediu care influențează riscul de cădere la pacientul vârstnic sunt:

- a) Podelele alunecoase și denivelate și scările.
- b) Osteoporoza.
- c) Disfuncțiile vestibulare.

65. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:

- a) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
- b) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență;
- c) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului.

66. Identificați afirmația eronată referitoare la reluarea alimentației în perioada postoperatorie:

- a) Realimentarea se face după reluarea tranzitului intestinal pentru materii fecale, în general după 3-4 zile.
- b) Reluarea alimentației se face într-o manieră progresivă în funcție de intervenția realizată, cu ajutorul dieteticianului.
- c) Reluarea alimentației se realizează cât mai curând posibil, respectând preferințele pacientului.

67. Vă rugăm să bifați varianta corectă care face referire la elementele obligatorii în etichetarea recipientelor de colectare a deșeurilor periculoase:

- a) Pictograma "Pericol biologic", numele secției din care provine deșeurul și data eliminării.
- b) Tipul deșeurului, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii recipientului pe secție, unitatea sanitară și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive.
- c) Unitatea sanitară și secția care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive.

68. O complicație apărută în insuficiența renală acută este:

- a) Supraîncărcarea sodică și hidrică.
- b) Hipokaliemia.
- c) Hipercalcemia.

69. Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România este alcătuit din:

- a) Președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București.
- b) Reprezentantul autorității de stat.
- c) Președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București, și reprezentantul autorității de stat.

70. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:

- a) Avertisment.
- b) Suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.
- c) Mustrare.

71. Identificați care dintre scalele de mai jos reprezintă scale de evaluare funcțională a vârstnicului:

- a) Scala Bates-Jansen, Scala Downton, Scala Edinburg.
- b) Scala Katz, Scala Lawton, Scala Barthel.
- c) Scala Braden, Scala Norton, Scala Waterlow.

72. Semnul Koplik are mare valoare diagnostică pentru:

- a) rujeolă;
- b) rubeolă;
- c) oreion.

73. Cea mai mare doză de medicament suportată de organism fără să apară fenomene toxice este:

- a) Doza terapeutică.
- b) Doza toxică.
- c) Doza maximă.

74. Conduita de urgență în angina pectorală presupune:

- a) Administrarea de hemisuccinat de hidrocortizon.
- b) Administrare de mialgin.
- c) Administrare de nitroglicerină sublingual.

75. În infarctul miocardic examenul de laborator arată:

- a) Scăderea fibrinogenului.
- b) Creșterea transaminazelor.
- c) Leucopenie.

76. Este cunoscut efectul teratogen asupra sarcinii în primele 3 - 4 luni a virusului:

- a) Rujeolic
- b) Rubeolic
- c) Urlian

77. La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, depunerea jurământului

- a) Nu este obligatorie.
- b) Este obligatorie.
- c) Este opțională.

78. Identificați care dintre activitățile mai jos menționate nu sunt recomandate în strategia de minimizare a cantității de deșuri medicale prevăzută de cerințele legale actuale privind gestionarea deșeurilor medicale:

- a) Utilizarea de metode și echipamente moderne ce nu generează substanțe chimice periculoase și tratarea deșeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termică la temperaturi scăzute.
- b) Achiziționarea materialelor de unică folosință.
- c) Separarea la sursă prin asigurarea că deșeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii și eliminarea finală în condiții corespunzătoare.

79. În situația în care la locul de muncă v-ați accidentat prin expunere percutanată la produse biologice, ce măsuri aplicați în cadrul îngrijirii de urgență:

- a) Spălare cu apă și săpun, urmată de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandărilor producătorului.
- b) Spălare cu ser fiziologic sau cu apă 5 minute.
- c) Spălare cu apă și săpun 5 minute.

80. În examenul de urină proba “celor 3 pahare” stabilește proveniența:

- a) Hematuriei.
- b) Piuriei.
- c) Albuminuriei.

81. Agentul etiologic al oreionului este:

- a) Virusul urlian.
- b) Virusul varicelo - zosterian.
- c) Virusul Epstein -Barr.

82. Atunci când două suprafețe articulare nu mai au nici un contact între ele, leziunea se numește:

- a) Luxație completă.
- b) Subluxație.
- c) Entorsă.

83. Derivațiile unipolare ale membrelor în EKG sunt:

- a) V1, V2, V3 V4, V5 V6,.
- b) D I, D II, D III.
- c) aVR, aVL, aVF.

84. Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România, precum și organele de conducere ale filialelor județene, respectiv a municipiului București se subordonează din punct de vedere ierarhic:

- a) Consiliului national al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România.
- b) Președintelui Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România.
- c) Adunării generale.

85. Identificați afirmația eronată referitoare la scopul spălăturii vaginale :

- a) Stimularea micțiunii.
- b) Prevenirea iritațiilor și escoriațiilor.
- c) Îndepărtarea mirosului.

86. Rujeola are incubăția:

- a) Scurtă 2-3 zile.
- b) Fixă 10 zile.
- c) Lungă 21 - 25 zile.

87. Majoritatea vaccinurilor se păstrează:

- a) La congelator.
- b) La temperatura camerei.
- c) În frigider la 4 - 8 grade Celsius.

88. În infarctul miocardic febra, de obicei moderată, apare în:

- a) Primele 6 ore.
- b) După 72 de ore.
- c) Primele 24 - 48 ore.

89. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul:

- a) Trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență.
- b) Este optional.
- c) Nu este obligatoriu consimțământul reprezentantului legal.

90. Care dintre afirmațiile de mai jos nu constituie încălcări ale regulilor etice:

- a) Blamarea și defăimarea profesională.
- b) Jignirea și calomnierea profesională.
- c) Absentarea nemotivată de la locul de muncă sau întârzierile repetate la programul de lucru.

91. Care din următoarele atribuții nu aparțin asistenților medicali care își desfășoară activitatea în unitățile de transfuzii din spitale :

- a) Răspund de apariția reacțiilor adverse severe și a incidentelor adverse posttransfuzionale provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total și a componentelor sanguine sau de efectuarea greșită a testărilor pretransfuzionale.
- b) Recoltează și efectuează testările pretransfuzionale.
- c) Supraveghează funcționarea și întreținerea echipamentelor din dotarea unității de transfuzie sanguină, din spital, luând măsuri în condițiile apariției unor defecțiuni în funcționarea acestora, conform procedurilor standard.

92. Testarea receptivității prin testul Schick se face în:

- a) febră tifoidă;
- b) difterie.
- c) tifos;

93. Nitroglicerina poate provoca efecte neplăcute, printre care:

- a) Paloarea feței.
- b) Cefalee cu valuri de căldură.
- c) Hipertensiune arterială.

94. În varicelă erupția se caracterizează prin:

- a) Lipsa din axile.
- b) Distribuție centripetă.
- c) Distribuție centrifugă.

95. După finalizarea alimentației pe gastrostomă asistentul medical va recomanda pacientului să adopte :

- a) Poziția lateral stânga.
- b) Poziția de decubit dorsal.
- c) Poziția șezândă sau semișezândă.

96. Vă rugăm să identificați care dintre testele menționate mai jos nu sunt prevăzute în protocolul de efectuare a testelor pretransfuzionale al spitalului stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1224/ 2006:

- a) Determinarea grupului sanguin ABO și Rh(D) la pacient.
- b) Depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienților imunizați și politransfuzati.
- c) Testul Quick și viteza de sedimentare.

97. Deșeurile periculoase marcate cu simbolul asterisc (*) sunt clasificate ca fiind deșeuri:

- a) Nepericuloase.
- b) Citotoxice.
- c) Periculoase.

98. Profilaxia tuberculozei prin creșterea rezistenței specifice cuprinde:

- a) Vaccinarea antituberculoasă.
- b) Cultură fizică și sport.
- c) Îmbunătățirea condițiilor de mediu.

99. Înscrierea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se face la:

- a) Filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, la filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
- b) Direcția de Sănătate Publică.
- c) Ministerul Sănătății.

100. Tratamentul luxației presupune:

- a) Repaus articular și imobilizare cu aparat gipsat 2-3 săptămâni.
- b) Repaus articular 1-2 zile prin imobilizare cu bandaj elastic.
- c) Repaus articular și imobilizare cu aparat gipsat 6 săptămâni.